

## **FICHA TÉCNICA** **FULMOLINE - Cucarachicida en gel**

### **1)-NOMBRE Y MARCA DEL PRODUCTO**

Nombre del producto: Cucarachicida en gel

Marca: Fulmoline

### **2)-FORMAS DE PRESENTACIÓN**

Jeringa conteniendo 8 g en estuche de cartulina.

### **3)- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAGUICIDA**

#### **Características**

- Formulación: gel
  - Principio activo: fipronil al 0.05%
  - Grupo químico: fenilpirazoles
  - Categoría toxicológica del plaguicida: Poco peligroso en el uso normal
  - Plaga Blanco: cucarachas
  - Efectiva protección con poder residual. Su alto poder residual está presente durante tres meses luego de su aplicación.
- Uso doméstico

#### **Instrucciones de uso:**

- 1-retire la tapa de la jeringa
- 2-identifique los espacios donde suelen estar las cucarachas habitualmente: cocinas, baños, lavaderos, etc.
- 3-presione de forma suave el émbolo de la jeringa y aplique pequeños puntos del gel (2mm de diámetro por m2 o metro lineal) en lugares como cajones, alacenas, debajo de heladeras, entrada de cañerías y otros espacios donde puedan transitar.
- 4-evite colocar el gel en lugares accesibles para niños y mascotas.
- 5-repita la aplicación cada 3 meses para mantener a las cucarachas alejadas.

#### **Precauciones**

- CUIDADO! PELIGROSO!
- ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO
- CUIDADO, PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACION O ABSORCON POR LA PIEL.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS O ANIMALES DOMESTICOS.
- TOXICO- NO INGERIR
- No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.
- No comer ni fumar durante su aplicación.
- Mantener el producto en envase original.

- No volver a utilizar los envases vacíos.
- Jeringa: prohibido su relleno
- solo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños o animales domésticos.
- preferiblemente utilizar guantes durante la aplicación del producto.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

**Primeros auxilios**

Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.  
En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón.  
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua corriente.  
En caso de intoxicación dirigirse al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o rótulo del producto.  
Consultas en caso de intoxicaciones: C.I.A.T. Hospital de Clínicas- tel: 1722

**Indicaciones para uso médico:**  
Grupo químico: fenilpirazoles  
Nombre común: fipronil  
Antídoto: tratamiento sintomático.

**4)- FORMULA**

Fipronil .....0.05 %  
Componentes inertes.....c.s.p 100 %

**5)- VIDA UTIL PROPUESTA**

Vida Útil: 3 años a partir de la fecha de fabricación.  
El producto es estable y mantiene sus propiedades en condiciones normales de almacenamiento.