

## **FICHA TÉCNICA** **FULMOLINE - Raticida Monodósico**

### **1)-NOMBRE Y MARCA DEL PRODUCTO**

Nombre del producto: Fulmoline- Raticida Monodósico

Marca: Fulmoline

### **2)-FORMAS DE PRESENTACIÓN**

-Estuche de cartulina conteniendo 50 g o 100 g de producto en bolsa de polietileno de alta densidad y bandeja para colocar el raticida, de poliestireno de alto impacto.

- bolsa conteniendo 5 kg

### **3)- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAGUICIDA**

#### **Características**

-Formulación: Cebo a base de granos de cereales sólido.

-Principio activo: Brodifacoum ( 3(3-(4-Bromobiphenyl-4,1)- 1,2,3,4,-tetrahidro-1-naphthyl) -4-hidroxicumarin)

-Grupo Químico: anticoagulante superwarfarínico.

-Modo de acción: Este Producto a base de Brodifacoum es anticoagulante monodósico.

Interfiere con el metabolismo normal de la vitamina K, inhibiendo la coagulación de la sangre.

La muerte que provoca es semejante a la producida por debilidad por vejez, no haciendo que sus congéneres desconfíen del alimento.

Con una única ingesta elimina ratas, ratones y lauchas. Dependiendo de su tamaño, basta con que una rata consuma entre 0.6 y 1.3 gramos de Fulmoline para que esta muera y para el ratón basta que consuma entre 0.2 y 0.7 gramos. Los primeros roedores muertos podrán observarse ya a los 3 días, continuando la mortandad hasta los 14 días siguientes a la colocación de los cebos.

-Plaga Blanco: rata gris, noruega o de las cloacas (*Rattus norvegicus*), Rata negra o domestica (*Rattus rattus*), Rata alejandrina o de los tejados (*Rattus rattus alejandrinus*), rata colorada ( *Holochilus brasiliensis*), Ratón doméstico( *Mus musculus*), ratón de campo ( *Akodon sp.*, *Calomys sp.*) -

- Contiene Bitrex, sustancia de sabor amargo, que evita que cualquier ser humano desee ingerir.

-Categoría del plaguicida: categoría III ( Ligeramente tóxico)

#### **Modo de uso.**

1. Colocar el cebo en montones pequeños en los lugares en que se observen signos de presencia de roedores (ej: excrementos, deterioro provocado por mordeduras, etc.) en donde habitan, se alimentan o transitan.
2. Para ratas en montones de 20 o 30 g cada 5 o 10 metros, y para ratones, en montones de 5 a 10 g cada 2 a 5 metros, dependiendo de la severidad, gravedad y tamaño de la infestación.
3. Evitar que el raticida quede al alcance de los niños, animales domésticos y las aves.

4. Recomendamos colocar el cebo dentro de tubos o cajas invertidas que permitan la circulación exclusiva de los roedores, de modo que estos se sientan mas confiados al comer escondidos.
5. Revisar semanalmente los lugares con cebo y reponer lo consumido. Proseguir hasta que no se detecte mas consumo.

#### **Precauciones**

Fulmoline, a base de brodifacoum, es anticoagulante monodósico..

**CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS**

Durante su aplicación usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos

No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.

No aplicar en conductos de aire o fuentes de ventilación que posibiliten la liberación del rodenticida al ambiente.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto.

No comer, beber o fumar durante su aplicación

Guardar el producto en su envase original.

No volver a utilizar los envases vacíos.

Aplicar en lugares inaccesibles para los niños y los animales domésticos.

Después de usarlo lavarse bien las manos con agua y jabón.

Las mujeres embarazadas no pueden manipular el raticida.

No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.

Conservar el lugar desratizado en perfectas condiciones de limpieza.

Se recomienda descartar los roedores muertos, restos de agente tóxico (cebo) y embalaje, envolviendo previamente los mismos usando guantes y bolsas de residuos.

#### **Primeros auxilios**

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua corriente.

En caso de ingestión, no provocar el vómito.

En caso de intoxicación dirigirse al servicio de salud llevando el envase o rótulo del producto y consultar al C.I.A.T. Hospital de Clínicas- 7º piso (tel: 1722)

#### **Advertencia al médico interviniente:**

Grupo Químico: superwarfarínico, anticoagulante de segunda generación. Nombre: Brodifacoum.

Antídoto: Vitamina K1. La administración y la dosis están determinadas por la evolución clínica. Escala de toxicidad Categoría III. Teléfono de emergencia: En Uruguay , CIAT: 1722

#### **4)- FORMULA**

Brodifacoum .....0.005 mg

Cereales, colorantes, amargantes e inertes.....c.sp. 100 g

#### **5)- VIDA UTIL PROPUESTA**

Vida Útil: 3 años a partir de la fecha de fabricación.

El producto es estable y mantiene sus propiedades en condiciones normales de almacenamiento.